

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کاربرگ ترجمان دانش طرح‌های پژوهشی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

عنوان طرح پژوهشی	بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره ۱ درصد بر مدت زمان ترمیم و عوارض زخم سوختگی درجه دو در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه
کد طرح	۳۹۶۷۰۱
نام و نام خانوادگی مجری طرح	دانشجو: مهدی ابراهیمی استاد مشاور: رضا دریابیگی
دانشکده/مرکز تحقیقاتی	پرستاری مامایی

۱. مخاطبان طرح پژوهشی (لطفاً ضمن انتخاب افراد یا گروه‌هایی که بتوانند به طور مستقیم از نتایج طرح استفاده نمایند، به هر کدام از آنها وزن ۱ تا ۵ بدهید)

۳. گیرندگان خدمات سلامت (مردم، بیماران، رسانه‌ها) {۳}

۵. ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...) {۵}

۵. مدیران و سیاست‌گزاران نظام سلامت (مدیران بیمارستان، دانشگاه، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشتی و ...) {۵}

۵. سرمایه‌گذاران و بخش‌های تولیدی (کارخانجات دارویی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و ...) {۵}

☐ سایر مخاطبین (مثلاً سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، بهزیستی، آموزش و پرورش، مدیران خارج از نظام سلامت)

۲. آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته باشد؟

بله ☐ خیر ☒ نمی‌دانم ☐

۳. استخراج و نگارش پیام پژوهشی

الف. عنوان پیام یا خبر (حداکثر ۱۵ کلمه)

کرم بابونه باعث تسریع در بهبود زخم سوختگی و کاهش درد ناشی از آن می‌گردد.

نوع مخاطب: مردم و رسانه‌ها، پزشکان، مدیران و سیاست‌گزاران

شماره:

تاریخ:

پست:

به مقدمه و اهمیت موضوع (حداکثر ۴۰ کلمه)

در میان حوادثی که سلامتی انسان را به خطر می‌اندازد سوانح سوختگی از بدترین آن‌هاست. یکی از روش‌های متداول درمان زخم سوختگی استفاده از کرم سولفادیازین نقره ۱٪ می‌باشد که مهم‌ترین عارضه آن تأخیر در التیام زخم می‌باشد. لذا این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی داروی مؤثر در درمان زخم سوختگی انجام گردید، که به این منظور اثرات پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره بر زخم سوختگی درجه دو مقایسه شده است.

ج. یافته‌ها و پیام‌های اصلی پژوهش را به بدون استفاده از واژگان تخصصی و به زبان ساده بنویسید:

توجه: مسئولیت صحت پیام‌ها بر عهده مجری طرح می‌باشد.

پیام شماره ۱: (حداکثر ۵۰ کلمه) (برای مردم)

کرم بابونه موجب تسریع در بهبود و تسکین درد زخم سوختگی می‌گردد

پیام شماره ۲: (حداکثر ۵۰ کلمه) (برای پزشکان)

استفاده از کرم بابونه در مقایسه کرم سولفادیازین نقره یک درصد باعث کم کردن ۳ تا ۴ روزه دوره بهبود زخم سوختگی درجه دو سطحی می‌گردد و همچنین همزمان شدت درد زخم این بیماران را نیز کاهش می‌دهد.

پیام برای مدیران و سیاست‌گزاران:

استفاده از این دارو نسبت به درمان مرسوم در درمان زخم سوختگی، موجب کاهش استفاده از امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی به دلیل کاهش دوره درمان این بیماران می‌گردد.

د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج (حداکثر ۴۰ کلمه)

با توجه به نتایج مطالعه استفاده از این دارو (کرم بابونه) موجب بهبود بهتر و سریع تر زخم سوختگی درجه دو می‌گردد لذا توصیه می‌شود جهت ساخت این دارو و استفاده از آن در مراکز درمانی اقدام گردد.

د. کدامیک از روش‌های انتقال پیام را پیشنهاد می‌کنید؟ (می‌توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)

☐ تشکیل جلسه با گروه مخاطب، ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان بالقوه برای معرفی نتایج پژوهش

☒ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی داخلی

☒ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی خارجی

☐ انتشار نتایج پژوهش در روزنامه‌ها و مجلات کثیرالانتشار

☐ انتشار نتایج در خبرنامه‌ها و بولتن‌های درون‌سازمانی

☒ ارائه در کنفرانس‌ها و سمینارهای داخلی

☒ ارائه در کنفرانس‌ها و سمینارهای خارجی

☐ ارائه یافته‌های پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبه‌ها

☐ ارسال خلاصه یا گزارش کامل برای گروه‌های هدف



معاونت پژوهشی و فناوری

شماره:

☐ قرار دادن خلاصه یا گزارش کامل طرح بر روی وبسایت برای دسترسی استفاده کنندگان بالقوه

تاریخ:

☐ تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره به زبان ساده و متناسب با مخاطبین

پیوست:

☒ انجام اقدامات لازم برای تجاری سازی نتایج پژوهش (ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره)

☐ سایر موارد (لطفاً نام ببرید)

۴. چکیده طرح تحقیقاتی:

بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره ۱ درصد بر مدت زمان ترمیم و عوارض زخم سوختگی در جبهه دو در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سوختگی بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان در سال ۱۳۹۶

مقدمه و اهداف: در میان حوادثی که سلامتی انسان را به خطر می‌اندازد سوانح سوختگی از سخت‌ترین آن‌هاست. یکی از روش‌های متداول درمان زخم سوختگی استفاده از کرم سولفادیازین نقره ۱٪ می‌باشد که مهم‌ترین عارضه آن تأخیر در التیام زخم می‌باشد. لذا این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی داروی مؤثر در درمان زخم سوختگی انجام گردید، که به این منظور اثر کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره ۱٪ بر زخم سوختگی در جبهه دو مقایسه شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کار آزمایشی بالینی سه سو کور می‌باشد که در سال ۱۳۹۶ بر روی ۹۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سوختگی که دارای زخم سوختگی در جبهه دو با وسعت ۱-۱۰ درصد بودند، انجام شد. پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره، روزانه تا ترمیم زخم انجام گردید. مدت زمان ترمیم و بروز عفونت بر اساس چک لیست و درد با مقیاس VAS مورد ارزیابی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون‌های آماری من ویتنی، کای اسکوتر، تی مستقل و فیشر انجام شد و سطح $p < 0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بررسی داده‌ها نشان داد که مدت زمان ترمیم زخم سوختگی و میزان بروز عفونت و میانگین نمره درد بعد از مداخله در گروه تحت درمان با کرم بابونه نسبت به کرم سولفادیازین نقره ۱٪ کمتر می‌باشد ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: کرم بابونه نسبت به کرم سولفادیازین نقره ۱٪ در درمان زخم سوختگی مؤثرتر بوده و می‌تواند به عنوان یک درمان طبیعی جایگزین در درمان سوختگی در جبهه دو سطحی بکار برده شود.

کلیدواژه‌ها: پانسمان، سوختگی، کرم بابونه، کرم سولفادیازین، مدت زمان ترمیم زخم، عوارض زخم سوختگی

۵. آدرس اینترنتی مقاله (های) مستخرج از طرح:

رضا دریابیگی

<http://jmp.ir/acert.php?id=۲۳۷۸&code=۲f۰fc۷>