

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کاربرگ ترجمان دانش طرح‌های پژوهشی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

عنوان طرح پژوهشی	خوشه بندی نشانه ها در سالمندان مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستانهای اصفهان در سال ۹۷-۹۸
کد طرح	۳۹۷۵۷۵
نام و نام خانوادگی مجری طرح	حبیب اله حسینی
نام و نام خانوادگی همکاران طرح	خانم ارغوان اسماعیلی، خانم دکتر پروانه خراسانی، آقای دکتر مسعود بهرامی
دانشکده/مرکز تحقیقاتی	دانشکده پرستاری اصفهان

۱. مخاطبان طرح پژوهشی (لطفاً ضمن انتخاب افراد یا گروه‌هایی که بتوانند به طور مستقیم از نتایج طرح استفاده نمایند، به هر کدام از آنها وزن ۱ تا ۵ بدهید)

۴ گیرندگان خدمات سلامت (مردم، بیماران، رسانه‌ها)

۵ ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...)

۵ مدیران و سیاست‌گزاران نظام سلامت (مدیران بیمارستان، دانشگاه، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشتی و ...)

۲. آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟

☐ خیر

۳. استخراج و نگارش پیام پژوهشی

الف. عنوان پیام یا خبر (حداکثر ۱۵ کلمه)

خوشه بندی نشانه‌ها در سالمندان مبتلا به سرطان کولورکتال



معاونت پژوهشی و فناوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

ب. مقدمه و اهمیت موضوع (حداکثر ۴۰ کلمه)

پدیده سالمندی بعنوان یکی از مهم ترین چالش ها برای جامعه و سیستم مراقبت های بهداشتی مطرح می باشد شود و این دوره با مبتلا شدن به بیماری های مزمن متعدد همراه است. یکی از بیماری های شایع این دوران، سرطان کولورکتال است. سرطان کولورکتال یکی از انواع سرطان مرتبط با سن و شایع در سراسر جهان از جمله ایران میباشد.

ج. یافته ها و پیام های اصلی پژوهش را به بدون استفاده از واژگان تخصصی و به زبان ساده بنویسید:

توجه: طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشد. مسؤولیت صحت پیام ها بر عهده مجری طرح می باشد.
پیام شماره ۱: (حداکثر ۵۰ کلمه)

فراوانی نشانه های مربوط به خوشه روحی-روانی در سالمندان بیشتر است. . بیماران زن نشانه های روانشناختی و جسمی بیشتری نسبت به مردان داشتند و هر چه طول مدت بستری بیشتر بود نشانه های روانشناختی و جسمی بیشتر می شد. . بیمارانی که مدت تشخیص سرطان آنها کمتر از ۶ ماه بود نشانه های جسمی و روانشناختی بیشتری داشتند. . در این گروه (سالمندان)، رادیوتراپی نمی تواند درمان مناسبی باشد.

د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج (حداکثر ۴۰ کلمه)

پرستاری: نقش مهمی در ارزیابی و مدیریت کردن نشانه ها به عنوان یک فرآیند مستمر شغلی دارند. بنابراین نیاز است که شایع ترین نشانه ها را بشناسند و می بایست متوجه شوند که مدیریت کردن بهینه یک نشانه می تواند سایر نشانه های دیگر را کنترل کند

. **حیطه مدیریت پرستاری:** همچنین می بایست توجه به حمایت های روانشناختی و مشاوره ای و مددکاری برای بیماران در نظر گرفته شود. نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت توسط سوپروایزرهای آموزشی
د. کدامیک از روش های انتقال پیام را پیشنهاد می کنید؟ (می توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)

☐ تشکیل جلسه با گروه مخاطب، ذی نفعان و استفاده کنندگان بالقوه برای معرفی نتایج پژوهش

☒ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی داخلی

☐ انتشار مقاله در مجلات علمی - پژوهشی خارجی

☐ انتشار نتایج پژوهش در روزنامه ها و مجلات کثیرالانتشار

☐ انتشار نتایج در خبرنامه ها و بولتن های درون سازمانی

☒ ارائه در کنفرانس ها و سمینارهای داخلی

☐ ارائه در کنفرانس ها و سمینارهای خارجی

☐ ارائه یافته های پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبه ها

☐ ارسال خلاصه یا گزارش کامل برای گروه های هدف



- شماره:
تاریخ:
پوست:
- ☐ قرار دادن خلاصه یا گزارش کامل طرح بر روی وبسایت برای دسترسی استفاده‌کنندگان بالقوه
- ☒ تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره به زبان ساده و متناسب با مخاطبین
- ☐ انجام اقدامات لازم برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش (ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره)
- ☐ سایر موارد (لطفاً نام ببرید)

۴. چکیده طرح تحقیقاتی:

مقدمه: سرطان کولورکتال یکی از انواع سرطان مرتبط با سن و شایع در سراسر جهان از جمله ایران می‌باشد

هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین تکرار، شدت، دیسترس و خوشه‌بندی نشانه‌ها در سالمندان مبتلا به سرطان کولورکتال در

بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ می‌باشد.

روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در یک دوره زمانی شش ماهه بر روی ۳۰۰ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال

بیمارستان‌های منتخب اصفهان انجام شد. این مطالعه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم

پزشکی انجام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های مشخصات زمینه‌ای و مقیاس سنجش یاد آمد نشانه‌ها (MSAS) بود.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر شایعترین نشانه از نظر تکرار شامل خشکی دهان (۳۲٫۹۲٪) و بی حسی و مورمور شدن (۲۴٫۵۵٪) و

شایعترین نشانه از نظر فراوانی شامل خشکی دهان (۸۰٫۳۳٪) و تهوع (۸۶٪)، شایع‌ترین نشانه از نظر شدت، خشکی دهان با ۴۱٪

پاسخ شدید و تهوع با ۲۹٫۸٪ پاسخ شدید بود. همچنین شایعترین نشانه از نظر دیسترس شامل "من شبیه خودم نیستم" (۶٪) و خشکی

دهان (۳۵٫۳٪) بود. نهایتاً پنج خوشه شامل نشانه‌های سیستمیک، روحی روانی، قلبی-عروقی، مخاطی-پوستی و گوارشی بدست

آمد.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نشانه‌های روحی-روانی بالاتر از نشانه‌های جسمی بیشترین درصد از نظر میزان

تکرار، شدت و دیسترس در این بیماران به خود اختصاص داده‌اند.



کلیدواژه‌ها: . نشانه‌های خوشه‌ای، سالمندان، سرطان کولورکتال

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۵. عنوان (ها) و آدرس اینترنتی مقاله (های) مستخرج از طرح:

الف. مقاله فارسی:

عنوان: تعیین تکرار، شدت، دیسترس و خوشه‌بندی نشانه‌ها در سالمندان مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان - ایران در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

<http://..... Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal>

Zanjan University of Medical Science

ب. عنوان مقاله انگلیسی:

Title: **Recurrence, severity, distress and clustering of symptoms in the elderly with colorectal cancer in selected hospitals of Isfahan**
in ۲۰۱۸-۱۹

<http://..... Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal>

۶. تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتی (Max:

(۲۰۰ Kb | JPG,PNG,GIF

امضاء مجری طرح پژوهشی